

Persbericht

PB99-108
29 april 1999
9.30 uur

Twee griepgolven veroorzaken hogere sterfte in 1998

In 1998 zijn 138 duizend inwoners van Nederland overleden. Dit zijn er ruim tweeduizend meer dan in het jaar daarvoor. De stijging van het aantal sterfgevallen houdt verband met twee griepgolven die in maart en december van vorig jaar zijn aangevangen. Mede in verband met de griepepidemie is ook de sterfte ten gevolge van CARA, longontsteking en hart- en vaatziekten in 1998 toegenomen.

Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt verder dat hart- en vaatziekten en kanker bijna tweederde van het totaal aantal sterfgevallen in Nederland veroorzaken. De sterfte aan de ademhalingsziekten is de derde belangrijke oorzaak. Verder blijkt dat het aantal sterfgevallen aan aids blijft afnemen.

Griepgolven hoofdoorzaak hogere sterfte

Griepgolven die in maart en in december vorig jaar zijn aangevangen vormden de oorzaak van de toename in het aantal overledenen. Het aantal sterfgevallen met "influenza" als primaire doodsoorzaak lag in deze maanden aanmerkelijk hoger dan normaal. Bekend is verder dat een influenza-infectie ernstige gevolgen kan hebben voor vooral oudere mensen boven de 75 jaar. Tijdens de griepgolven zijn dan ook meer mensen uit deze leeftijdsgroep gestorven. In 1998 was sprake van een zachte winter. Uit de CBS-cijfers blijkt dat in januari en februari veel minder mensen zijn gestorven dan in andere jaren in dezelfde periode.

Hart- en vaatziekten meest voorkomende doodsoorzaak

Hart- en vaatziekten vormen nog steeds de belangrijkste doodsoorzaak met 50 duizend overledenen. Dit niveau is vergelijkbaar met 1997. De dalende trend van de sterfte aan hart- en vaatziekten van de afgelopen jaren heeft zich in 1998 niet voortgezet. Dit is veroorzaakt door de twee griepgolven in 1998.

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71
E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van
het Ministerie van
Economische Zaken

Sterfte aan kanker stabiel

Kanker eiste vorig jaar ruim 37 duizend levens op, een kwart van alle overledenen. Kanker komt na hart- en vaatziekten daarmee op een tweede plaats in rangorde van de doodsoorzaken. De sterfte aan kanker is vorig jaar op hetzelfde niveau gebleven als in 1997.

Sterfte door ziekten van de ademhalingsorganen toegenomen

In 1998 zijn 14 duizend mensen gestorven aan ziekten van de ademhalingsorganen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door longontsteking (42%) en CARA (50%). Ten opzichte van 1997 is de sterfte aan de ziekten van de ademhalingsorganen met 6,5 procent toegenomen. Ook hier zijn de twee griepgolven in 1998 bepalend voor de verhoogde sterfte geweest.

Acuut hartinfarct komt vooral voor bij mannen

Bij mannen is het acuut hartinfarct de belangrijkste doodsoorzaak, gevolgd door longkanker en het herseninfarct. Van de sterfte aan kanker vormt longkanker de belangrijkste doodsoorzaak: ruim 6 600 overledenen in 1998. Dit is 32 procent van de totale kankersterfte bij mannen. In 1998 zijn er minder mannen aan longkanker overleden dan het jaar daarvoor. De daling van de afgelopen 10 jaar zet daarmee door.

Herseninfarct komt veel bij vrouwen voor

Bij vrouwen eist het herseninfarct de meeste levens op, gevolgd door het acuut hartinfarct en borstkanker. De sterfte aan borstkanker is vorig jaar op hetzelfde niveau gebleven als in 1997.

Opvallend is dat bij vrouwen het aantal overledenen aan longkanker vanaf 1970 zeer sterk is toegenomen. In 1998 neemt longkanker met bijna tweeduizend sterfgevallen na borstkanker de tweede plaats in binnen het totaal aantal sterfgevallen aan kanker. De kans om aan longkanker te overlijden is voor vrouwen echter nog aanmerkelijk kleiner dan het overlijden aan borstkanker. Aan borstkanker zijn vorig jaar ruim 3 500 vrouwen overleden.

Daling van het aantal aids-doden zet door

Uit de voorlopige cijfers van het CBS blijkt tevens dat het aantal sterfgevallen aan aids blijft afnemen. Vorig jaar zijn er in Nederland 135 mensen aan aids overleden. Dit is ruim 25 procent minder dan in 1997 toen nog 184 mensen aan aids overleden. In 1996 waren er in totaal

nog 327 aids-doden, tegenover 439 in 1995. Het grootst aantal slachtoffers viel in 1994, toen overleden 444 mensen aan aids. In Nederland worden aids-patiënten sinds 1982 geregistreerd. Sinds die tijd heeft deze ziekte in Nederland het leven gekost aan bijna 3 500 mensen.

Technische toelichting

De gegevens zijn afkomstig uit de doodsoorzakenstatistiek van het CBS. Deze wordt samengesteld op basis van doodsoorzaakverklaringen die door artsen worden ingevuld. De cijfers over 1998 hebben een voorlopig karakter en hebben alleen betrekking op Nederlandse ingezetenen.

Noot voor de redactie

Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Statistiek in Voorburg, dhr. J. Hoogenboezem, tel. (070) 337 52 64. Overige informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070) 337 58 16.

Aantal overledenen naar maand van overlijden in 1997 en 1998*

	Totaal		Hart- en vaatziekten		Ziekten van de ademhalingsorganen	
	1997	1998*	1997	1998*	1997	1998*
januari	14.200	11.821	5.330	4.599	1.967	1.212
februari	11.676	10.791	4.305	3.945	1.520	1.111
maart	11.258	12.969	4.154	4.714	1.040	1.654
april	10.872	12.337	4.037	4.478	986	1.574
mei	11.148	11.588	4.078	4.104	1.019	1.192
juni	10.690	10.507	3.772	3.795	960	842
juli	10.684	10.994	3.834	3.819	921	950
augustus	11.658	10.729	4.043	3.695	1.088	929
september	10.178	10.644	3.720	3.820	751	874
oktober	10.981	11.042	4.100	4.075	920	1.010
november	10.773	11.292	3.986	4.240	929	1.059
december	11.665	13.254	4.402	4.761	1.075	1.632
totaal	135.783	137.968	49.761	50.045	13.176	14.039

