

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002–2005

08

Frank van der Linden en Anouk de Rijk

Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk)



Verklaring van tekens

.	= gegevens ontbreken
*	= voorlopig cijfer
x	= geheim
–	= nihil
–	= (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
0 (0,0)	= het getal is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
niets (blank)	= een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
2005–2006	= 2005 tot en met 2006
2005/2006	= het gemiddelde over de jaren 2005 tot en met 2006
2005/'06	= oogstjaar, boekjaar, schooljaar enz., beginnend in 2005 en eindigend in 2006
2003/'04–2005/'06	= oogstjaar, boekjaar enz., 2003/'04 tot en met 2005/'06

In geval van afronding kan het voorkomen dat het weergegeven totaal niet overeenstemt met de som van de getallen.

Colofon

Uitgever

Centraal Bureau voor de Statistiek
Prinses Beatrixlaan 428
2273 XZ Voorburg

eind augustus 2008:

Henri Faasdreef 312
2492 JP Den Haag

Prepress

Centraal Bureau voor de Statistiek - Facilitair bedrijf

Omslag

TelDesign, Rotterdam

Inlichtingen

Tel. (088) 570 70 70
Fax (070) 337 59 94
Via contactformulier: www.cbs.nl/infoservice

Bestellingen

E-mail: verkoop@cbs.nl
Fax (045) 570 62 68

Internet

www.cbs.nl

© Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 2008.
Vereenvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting bij het onderzoek

Bron

De tabellen zijn samengesteld met behulp van de Nationale Verzuimstatistiek (NVS). De verzuimcijfers worden elk kwartaal samengesteld door ziekteverzuimgegevens van arbodiensten, werknemers- en verzuimgegevens (vangnetgroepen) van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en werknemersgegevens van het CBS met elkaar te combineren. De berekeningen in deze tabellen hebben betrekking op jaarcijfers.

Opmerkingen

Als gevolg van het gebruik van een andere versie van de basisbestanden en het gebruik van het GBA voor de berekening van leeftijd, vertonen enkele cijfers in deze tabellenset lichte afwijkingen in vergelijking met de uitkomsten op Statline.

Voor het jaar 2005 hebben leveranciers van verzuimdata gegevens geleverd over het verzuim van 66% van de werknemers in Nederland. De cijfers van 2005 zijn vooralsnog voorlopig van aard. Daarnaast zal in het najaar van 2008 een algehele herziening van de NVS plaatsvinden. De verwachting is dat na deze herziening de cijfers van 2002-2005 enigszins zullen afwijken van eerder gepubliceerde cijfers.

De Nationale VerzuimStatistiek (NVS) komt in de plaats van het kwartaalonderzoek 'Ziekteverzuim Particuliere Bedrijven' dat het CBS over de jaren 1995 tot en met het eerste kwartaal 2004 heeft gehouden. Dit onderzoek was gebaseerd op een schriftelijke enquête bij een steekproef van bedrijven. Tevens vervangt de NVS op termijn het kwartaalonderzoek 'Ziekteverzuim Rijksoverheid' (onderzoekperiode 1992 t/m 2004) en het jaaronderzoek 'Ziekteverzuim Overheid' (onderzoekperiode 1992 t/m 2003). De genoemde statistieken blijven overigens op StatLine beschikbaar.

Welke ziekteperioden tot eenzelfde verzuimgeval behoren, kan niet altijd bepaald worden. Dit heeft gevolgen voor de berekening van het aantal verzuimde dagen en dientengevolge voor de berekening van de verzuimgrootheden, gemiddelde ziekteverzuimduur en ziekmeldingsfrequentie.

Bij vergelijking van de uitkomsten van de NVS met de uitkomsten van de eerdere ziekteverzuimstatistieken moet met het volgende worden rekening gehouden:

- In de NVS is ook het ziekteverzuim bij de overheid opgenomen. Daardoor is de NVS niet geheel vergelijkbaar met de oude kwartaalstatistieken, waarbij rijksoverheid en Particuliere bedrijven apart worden weergegeven.
- In de statistiek ziekteverzuim Rijksoverheid werd in het verzuimcijfer verzuim langer dan een jaar ook meegerekend (bij de NVS is dit vanaf 2005).
- De NVS geeft alleen het door arbodiensten en UWV geregistreerde verzuim weer.
- In de NVS zijn op dit moment nog niet voldoende gegevens aanwezig van het verzuim in de sector landbouw en visserij, zorg, onderwijs en financiële instellingen.
- De NVS maakt het mogelijk dat verschillende achtergrondkenmerken aan het verzuim gekoppeld kunnen worden en dat meerdere verzuimgrootheden weergegeven kunnen worden.
- Er wordt nader onderzoek verricht naar de mogelijkheden van de publicatie van verzuimcijfers voor de (Rijks)overheid afzonderlijk.

Begrippen

Ziekteverzuim- percentage

Het verzuimpercentage (ZVP) geeft aan welk deel van de arbeidscapaciteit in een bepaalde periode wegens verzuim verloren is gegaan. De vaststelling gebeurt op basis van alle ziektegevallen die zich in de verslagperiode voordoen (dus niet op basis van nieuwe of beëindigde ziektegevallen). Het ZVP wordt berekend door het totaal van de verzuimde dagen in periode t te delen door de potentieel beschikbare dagen in periode t, maal 100.

Ziekmeldingsfrequentie	Ziekmeldingsfrequentie (ZMF) wordt berekend door het totaal aantal ziekmeldingen te delen door het totaal aantal gewerkte dagen en te vermenigvuldigen met het aantal dagen in het jaar. Het betreft het gemiddeld aantal nieuwe ziektegevallen per werknemer in een bepaalde periode, omgerekend naar jaarbasis. Gewerkte dagen van deeltijdwerkers worden meegerekend als fulltime dagen.
Gemiddelde ziekteverzuimduur	De gemiddelde ziekteverzuimduur (ZVD) heeft betrekking op de duur van de ziekte (maximaal 365 kalenderdagen). Een eenduidige interpretatie van de stijging of daling van de ZVD is niet mogelijk zonder daarin het ziekteverzuimpercentage en de ziekmeldingsfrequentie te betrekken. De ZVD is gebaseerd op de beëindigde verzuimgevallen in de verslagperiode. Gedeeltelijk verzuim geldt als volledig verzuim. Om de ziekteduur van deeltijders te kunnen vaststellen, zijn de deeltijders meegerekend als fulltimers. ZVD wordt berekend door de som van de duur verzuimgevallen in periode t beëindigde gevallen te delen door het aantal beëindigde verzuimgevallen in periode t.
Leeftijd	De leeftijd van de werknemer in jaren per ultimo december. De leeftijd in ingedeeld in de volgende klassen: <ul style="list-style-type: none"> – 15-19 jaar – 20-24 jaar – 25-29 jaar – 30-34 jaar – 35-39 jaar – 40-44 jaar – 45-49 jaar – 50-54 jaar – 55-59 jaar – 60-64 jaar
Ziekte	De definitie van het begrip ziekte is terug te vinden in de wettelijke bepalingen en jurisprudentie ten aanzien van loonderving bij afwezigheid wegens ziekte, met uitzondering van partieel verzuim. Van personen die gedeeltelijk ziek zijn of gedeeltelijk werken, worden in het verzuimpercentage de uren die men werkt niet meegerekend als verzuim.
Populatie	<p>Het nauwkeurig bepalen van de populatie is van groot belang voor de berekening van verzuimcijfers. Tot de NVS populatie wordt gerekend: alle gevallen die binnen de verslagperiode voor minimaal één van de wetten WW, ZW en/of WAO verplicht verzekerd zijn geweest, door middel van het hebben van een dienstverband. Uitsluitend personen die konden worden teruggevonden in de GBA zijn bij de berekeningen meegenomen.</p> <p>Onder de NVS-werknemerspopulatie wordt verstaan: Alle personen die binnen de verslagperiode voor minimaal één van de wetten WW, ZW en/of WAO/WIA verplicht verzekerd zijn, door middel van het hebben van een dienstverband (een persoon kan meerdere dienstverbanden hebben binnen de verslagperiode, maar niet meer dan één dienstverband op hetzelfde moment).</p> <p>Onder de NVS-verzuimpopulatie wordt verstaan: Nederlandse werknemers woonachtig in Nederland met een dienstverband, die tijdens het dienstverband zich ziek melden en recht hebben op: doorbetaling van (een deel van) hun loon óf een Ziektewetuitkering (oproepkrachten of uitzendkrachten, vrouwen die ziek zijn door hun zwangerschap of bevalling, arbeidsgehandicapten die ziek worden in de eerste vijf jaar na indiensttreding, orgaandonoren).</p>

Tabellenoverzicht

- Tabel 1 Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2002
- Tabel 2 Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2003
- Tabel 3 Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2004
- Tabel 4 Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2005

Tabel 1

Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2002

	Ziekteverzuim (ZVP)			Ziekmeldingsfrequentie (ZMF)			Gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen (ZVD)		
	Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht	
		Man	Vrouw		Man	Vrouw		Man	Vrouw
	%			aantal meldingen			dagen		
Leeftijd totaal	5,3	4,8	6,0	1,15	1,07	1,24	18,0	17,0	19,0
15 tot 19 jaar	1,5	1,5	1,4	0,56	0,57	0,55	9,0	8,8	9,1
20 tot 24 jaar	3,5	2,8	4,2	1,10	0,94	1,25	11,9	10,7	12,8
25 tot 29 jaar	5,0	3,7	6,5	1,37	1,17	1,58	14,4	11,8	16,4
30 tot 34 jaar	5,6	4,4	7,2	1,32	1,20	1,46	16,6	13,7	19,3
35 tot 39 jaar	5,6	4,9	6,7	1,25	1,19	1,32	17,5	15,6	19,5
40 tot 44 jaar	5,8	5,3	6,5	1,20	1,16	1,24	18,7	17,5	20,1
45 tot 49 jaar	6,0	5,7	6,6	1,14	1,11	1,19	20,6	19,7	21,6
50 tot 54 jaar	6,4	6,2	6,6	1,06	1,04	1,09	23,5	23,1	24,2
55 tot 59 jaar	6,6	6,7	6,5	0,95	0,95	0,96	27,2	27,2	27,3
60 tot 64 jaar	5,1	5,4	4,4	0,62	0,65	0,56	31,4	31,5	31,3

Bron: CBS - Nationale Verzuimstatistiek

Tabel 2

Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2003

	Ziekteverzuim (ZVP)			Ziekmeldingsfrequentie (ZMF)			Gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen (ZVD)		
	Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht	
		Man	Vrouw		Man	Vrouw		Man	Vrouw
	%			aantal meldingen			dagen		
Leeftijd totaal	4,7	4,3	5,3	1,16	1,08	1,25	14,6	14,0	15,4
15 tot 19 jaar	1,3	1,3	1,3	0,53	0,54	0,52	8,1	7,9	8,4
20 tot 24 jaar	3,1	2,5	3,8	1,05	0,90	1,20	10,2	9,3	10,8
25 tot 29 jaar	4,5	3,3	5,8	1,37	1,15	1,59	11,8	9,9	13,3
30 tot 34 jaar	5,0	3,9	6,4	1,35	1,21	1,50	13,4	11,4	15,2
35 tot 39 jaar	4,9	4,3	6,0	1,27	1,20	1,35	14,3	12,9	15,8
40 tot 44 jaar	5,1	4,7	5,7	1,22	1,18	1,28	15,2	14,3	16,1
45 tot 49 jaar	5,3	5,0	5,7	1,18	1,15	1,23	16,4	15,8	17,2
50 tot 54 jaar	5,6	5,5	5,9	1,12	1,10	1,14	18,5	18,1	19,2
55 tot 59 jaar	5,8	5,8	5,7	1,01	1,01	1,00	20,9	20,8	21,1
60 tot 64 jaar	4,5	4,8	4,0	0,67	0,69	0,63	24,4	24,7	23,7

Bron: CBS - Nationale Verzuimstatistiek

Tabel 3

Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2004

	Ziekteverzuim (ZVP)			Ziekmeldingsfrequentie (ZMF)			Gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen (ZVD)		
	Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht	
		Man	Vrouw		Man	Vrouw		Man	Vrouw
	%			aantal meldingen			dagen		
Leeftijd totaal	4,1	3,9	4,3	1,05	1,03	1,09	17,3	16,8	18,0
15 tot 19 jaar	0,9	1,0	0,9	0,37	0,41	0,33	9,6	9,2	10,1
20 tot 24 jaar	2,3	2,1	2,6	0,82	0,77	0,89	11,5	10,7	12,5
25 tot 29 jaar	3,5	2,8	4,4	1,19	1,05	1,40	12,8	11,5	14,3
30 tot 34 jaar	4,0	3,4	5,0	1,23	1,14	1,36	14,7	13,1	16,7
35 tot 39 jaar	4,3	3,9	5,0	1,18	1,15	1,24	16,2	14,9	18,2
40 tot 44 jaar	4,6	4,3	5,1	1,16	1,14	1,19	18,0	17,1	19,7
45 tot 49 jaar	5,0	4,8	5,4	1,15	1,14	1,15	19,8	19,0	21,4
50 tot 54 jaar	5,4	5,4	5,6	1,11	1,13	1,07	22,6	21,9	24,1
55 tot 59 jaar	5,8	5,9	5,4	1,03	1,06	0,94	25,8	25,6	26,6
60 tot 64 jaar	4,9	5,0	4,4	0,71	0,73	0,65	31,0	31,1	30,8

Bron: CBS - Nationale Verzuimstatistiek

Tabel 4

Ziekteverzuim, ziekmeldingsfrequentie en gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen naar leeftijd en geslacht, 2005

	Ziekteverzuim (ZVP)			Ziekmeldingsfrequentie (ZMF)			Gemiddelde duur beëindigde ziektegevallen (ZVD)		
	Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht		Totaal	Geslacht	
		Man	Vrouw		Man	Vrouw		Man	Vrouw
	%			aantal meldingen			dagen		
Leeftijd totaal	4,2	4,1	4,4	1,03	1,01	1,07	17,4	17,0	18,1
15 tot 19 jaar	0,9	0,9	0,8	0,34	0,36	0,31	9,9	9,6	10,3
20 tot 24 jaar	2,1	1,9	2,3	0,72	0,68	0,77	11,4	10,7	12,3
25 tot 29 jaar	3,3	2,7	4,3	1,12	0,99	1,32	12,6	11,3	14,1
30 tot 34 jaar	4,0	3,4	5,0	1,22	1,12	1,37	14,2	12,7	16,2
35 tot 39 jaar	4,3	3,9	5,1	1,18	1,14	1,24	15,9	14,6	17,9
40 tot 44 jaar	4,7	4,5	5,3	1,15	1,14	1,18	17,7	16,8	19,4
45 tot 49 jaar	5,2	5,0	5,7	1,14	1,14	1,15	19,7	18,8	21,4
50 tot 54 jaar	6,0	5,9	6,1	1,13	1,15	1,10	22,6	21,9	23,9
55 tot 59 jaar	6,4	6,6	5,9	1,04	1,07	0,96	26,1	26,0	26,5
60 tot 64 jaar	5,5	5,6	5,1	0,73	0,75	0,66	31,9	31,6	32,8

Bron: CBS - Nationale Verzuimstatistiek